Point Chile S.A.

CIPERMETRINA 20 EC

CIPERMETRINA 20% EC, Insecticida *piretroide* de largo efecto residual, amplio espectro de acción y altamente eficaz en el control de insectos. Se recomienda para uso en salud pública e industrial, de gran efectividad en aplicaciones en lecherías, establos, agroindustrias, casas habitación, casinos y bodegas, para el control de moscas, zancudos, polillas, mosquitos, vinchucas, tábanos, baratas, hormigas, pulgas, chinches, tijeretas, garrapatas, y arañas.

Point Chile S.A.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- Insecticida piretroide biodegradable con un largo efecto residual y amplio espectro de acción.
- Posee baja toxicidad para el hombre y mamíferos en general.
- No mancha ni deja olores.
- Optima relación costo/ dosis.
- Su acción es por contacto e ingestión actuando a nivel del sistema nervioso del insecto.

RECOMENDACIONES DE USO

TRATAMIENTO RESIDUAL

INSECTOS	CONCENTRACION	SUPERFICIE	OBSERVACIONES
Voladores: Moscas, Zancudos, Avispas, Polillas, Tábanos, otros	*30 - 40 cc/ 5 lts de agua*	*100 m^2*	*En superficies muy absorbentes asperjar 30 – 40 cc/ 10 lts de agua.*
Rastreros: Hormigas, Baratas, Pulgas, Garrapatas, Chinches, Arañas, Vinchucas, Gorgojos, otros	*40 - 50 cc/ 5 lts de agua*	*100 m^2*	*En superficies muy absorbentes asperjar 40 – 50 cc/ 10 lts de agua.*

CONSIDERACIONES

- Evaluar la capacidad de absorción de la superficie a tratar y sus características .
- El tipo de equipo de aplicación a utilizar así como el sistema de aplicación son determinantes en el resultado y deben considerarse.

TRATAMIENTO AMBIENTAL

INSECTOS	CONCENTRACION	SUPERFICIE	OBSERVACIONES
Termoniebla *Voladores y rastreros*	*25 cc/ en 1 lt de agua o solvente*	*1000 m^3*	
U.L.V *Voladores y Rastreros:*	*25 - 50 cc/ 1.5 lts de agua*	*100 m^2*	

CONSIDERACIONES

- En aplicaciones exteriores la velocidad del viento no debe ser superior a 5 km/hr.
- Aplicaciones U.LV. determinar volumen de agua según modelo de equipo a utilizar.

Point Chile S.A.

DOSIS TECNICA RECOMENDADA.

I.A CONCENTRACIÓN	DOSIS TÉCNICA RECOMENDADA	
Cipermetrina 20 %	MANTENCIÓN/ baja infestación mg. de I.A. / m^2	ATAQUE/ alta infestación mg. de I.A. / m^2
* Considera aplicación de 24 a 48 cc de producto formulado * 100 mt^2	50	100

TOXICOLOGÍA

- GRUPO III MODERADAMENTE TOXICO.
- ANTíDOTO, TRATAMIENTO SINTOMÄTICO

ESPECIE	DOSIS LETAL MEDIA ORAL AGUDA DL 50 (mg. / Kg.)
Rata Ratón Pollo Pato	250 - 4.150 138 más de 2.000 más de 10.000
ESPECIE	**DOSIS LETAL MEDIA DERMAL AGUDA DL 50 (mg. / Kg.)**
Rata Conejo	más de 4.920 más de 2.460
ESPECIE	**DOSIS LETAL MEDIA RESPIRATORIA DL 50 (mg. / Lt.)**
Rata	2,5 (4h)

Fuente: Tomlin, C. (de.) 1997. The Pesticide Manual, 11º edición, BCPC.

Point Chile S.A.

PRECAUCIONES GENERALES.

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener fuera del contacto con alimentos o bebidas.
- Durante su manipulación no comer, ni beber, ni fumar.
- El tratamiento debe ser llevado a cabo sin presencia de personas ni animales
- Tiempo de ingreso al área tratada 2 a 4 horas según las condiciones del lugar.
- Ventilar a lo menos 1 hora.

INGREDIENTE ACTIVO	**Cipermetrina**
GRUPO QUIMICO	**Piretroide**
CONCENTRACION Y FORMULACION	**200 gr / lt EC (Concentrado emulsionable)**
FABRICANTE/FORMULADOR	**Point International ltd., Inglaterra**
DISTRIBUIDOR EN CHILE	**Point Chile S.A.**
REGISTRO I.S.P	**P-278/01**

PRESENTACION

BOTELLA 250 CC.
BOTELLA 1 LT.
BOTELLA 100 CC.

En caso de emergencia comunicarse con: RITA_CHILE (02) 6619414 / (02) 7771994.
Consultas generales comunicarse a POINT CHILE. (02) 7471677 / (09) 9692313.